

## アマリール OD 錠 0.5mg、アマリール OD 錠 1mg、 アマリール OD 錠 3mg

### 【この薬は？】

販売名	アマリール OD 錠 0.5mg Amaryl 0.5mg OD Tablets	アマリール OD 錠 1mg Amaryl 1mg OD Tablets	アマリール OD 錠 3mg Amaryl 3mg OD Tablets
一般名	グリメピリド Glimepiride		
含有量 (1錠中)	0.5mg	1mg	3mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」<http://www.info.pmda.go.jp/> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、経口血糖降下剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、すい臓に作用しインスリン分泌を促進して、血糖（血液中の糖分）を下げます。
- ・次の病気の人に処方されます。

#### 2型糖尿病

**（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）**

- ・この薬は、糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行ったうえで

効果が不十分な場合に限り、医師の判断により処方されます。

- ・この薬は、体調が良くなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○この薬により、重篤で長く続く低血糖症（脱力感、強い空腹感、冷や汗、動悸（どき）、手足のふるえ、意識が薄れるなど）になることがあります。患者の皆様や家族の方は、**【この薬を使う前に、確認すべきことは？】**、**【この薬の使い方は？】**および**【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】**に書かれていることに特に注意してください。

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・重いケトosis状態（深く大きい呼吸、意識がなくなる、手足のふるえ）の人、糖尿病性の昏睡状態になりそうな人、インスリン依存型糖尿病（1型糖尿病：インスリンがごく少量しか分泌されないか、あるいは全く分泌されないタイプの糖尿病）の人
- ・肝臓や腎臓に重篤な障害がある人
- ・重い感染症にかかっている人、手術をした人、または手術の予定がある人、大きな怪我をしている人
- ・下痢、嘔吐（おうと）などの胃腸障害のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人
- ・過去にアマリール錠に含まれる成分やスルホニルウレア系経口血糖降下剤で過敏な反応を経験したことがある人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前にそのことを医師または薬剤師に教えてください。

- ・肝臓や腎臓に障害がある人
- ・脳下垂体機能に異常のある人、副腎機能に異常のある人
- ・栄養状態の悪い人、飢餓状態の人、食事が不規則な人、食事が十分に摂れていない人、衰弱している人
- ・激しい筋肉運動をしている人
- ・飲酒量が多い人
- ・高齢の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	アマリール OD 錠 0.5mg	アマリール OD 錠 1mg	アマリール OD 錠 3mg
1 日量	1～4mg *		
飲む回数	1 日 1 回(朝食前または朝食後)、または 1 日 2 回(朝・夕食前または朝・夕食後)		

\* 0.5～1mg より開始し、適宜増減して維持量が決定されますが、1 日の最高量は 6mg です。

### ●どのように飲むか

この薬は、口の中で溶かして飲む薬です。舌の上で唾液を含ませ舌で軽くつぶして、唾液で飲み込みます。唾液だけでは飲み込めない場合はコップ 1 杯の水またはぬるま湯で飲み込んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。(低血糖を起こすことがあります。) 指示された時間に飲み忘れたら、1 回とばして、次の指示された時間に、1 回分飲んでください。

### ●多く使用した時(過量使用時)の対応

- ・低血糖症状(脱力感、強い空腹感、冷や汗、動悸(どうき)、手足のふるえ、意識が薄れるなど)があらわれる可能性があります。
- ・低血糖症状が認められるものの、意識障害がない場合は、通常は砂糖を飲食してください。 $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤(アカルボース、ボグリボース、ミグリトール)を併用している場合は、ブドウ糖を飲食してください。意識が薄れてきた場合は、ただちに受診してください。
- ・低血糖症状の一つとして意識障害を起こす可能性もありますので、この薬を飲んでいることを必ずご家族やまわりの方にも知らせてください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・低血糖症状(脱力感、強い空腹感、冷や汗、動悸(どうき)、手足のふるえ、意識が薄れるなど)があらわれることがあります。高所作業や自動車などの運転中に低血糖を起こすと事故につながります。特に注意してください。
- ・低血糖症状が認められるものの、意識障害がない場合は、通常は砂糖を飲食してください。 $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤(アカルボース、ボグリボース、ミグリトール)を併用している場合は、ブドウ糖を飲食してください。意識が薄れてきた場合は、ただちに受診してください。

- ・低血糖症状の一つとして意識障害を起こす可能性もありますので、この薬を飲んでることを必ずご家族やまわりの方にも知らせてください。
- ・この薬を使用中は、血糖や尿糖などを定期的に検査する必要があります。
- ・不摂生や感染症の合併などにより薬が効かなくなることがあります。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
低血糖 ていけつとう	めまい、空腹感、ふらつき、手足のふるえ、脱力感、頭痛、動悸（どうき）、冷や汗
汎血球減少 はんけつきゅうげんしょう	めまい、動悸（どうき）、耳鳴り、鼻血、出血しやすい、歯ぐきの出血、あおあざができる、息切れ
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	発熱、のどの痛み
溶血性貧血 ようけつせいひんけつ	ふらつき、立ちくらみ、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、疲れやすい、褐色尿、頭が重い、めまい、からだがだるい、動く時の動悸（どうき）や息切れ
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、皮下出血、出血が止まりにくい
肝機能障害 かんきのうしょうがい	皮膚が黄色くなる、嘔吐（おうと）、白目が黄色くなる、尿の色が濃くなる、吐き気、食欲不振、かゆみ、からだだるい
黄疸 おうだん	皮膚が黄色くなる、尿が褐色になる、白目が黄色くなる










同類薬（スルホニルウレア系経口血糖降下剤）であられる、特にご注意いただきたい重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。この薬でもあられる可能性があります。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
再生不良性貧血 さいせいふりょうせいひんけつ	階段や坂を上る時の動悸（どうき）や息切れ、鼻血、動悸（どうき）、息切れ、あおあざができる、めまい、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。  
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	ふらつき、脱力感、冷や汗、立ちくらみ、疲れやすい、からだがかたくなる、発熱
頭部	めまい、頭痛、頭が重い
眼	白目が黄色くなる
顔面	鼻血
耳	耳鳴り
口や喉	のどの痛み、歯ぐきの出血、嘔吐（おうと）、吐き気
胸部	動悸（どうき）、動く時の動悸（どうき）や息切れ、息切れ、吐き気、階段や坂を上る時の動悸（どうき）や息切れ
腹部	空腹感、食欲不振、吐き気
手・足	手足のふるえ
皮膚	皮膚が黄色くなる、あおあざができる、かゆみ、皮下出血
尿	褐色尿、尿の色が濃くなる、尿が褐色になる
その他	出血しやすい、出血が止まりにくい

## 【この薬の形は？】

販売名	アマリール OD 錠 0.5mg	アマリール OD 錠 1mg	アマリール OD 錠 3mg
PTP シート	 表面  裏面	 表面  裏面	 表面  裏面
形状	口腔内崩壊錠 	口腔内崩壊錠（割線入り） 	口腔内崩壊錠（割線入り） 
直径	4.5mm	6.5mm	8.5mm
厚さ	2.0mm	2.0mm	2.4mm
重さ	42.25mg	84.5mg	169mg
色	白色	淡紅色	微黄白色

識別 コード	NM1	NMM	NMH
-----------	-----	-----	-----

## 【この薬に含まれているのは？】

	アマリール OD 錠 0.5mg	アマリール OD 錠 1mg	アマリール OD 錠 3mg
有効成分	グリメピリド		
添加物	乳糖水和物、ポビドン、デンプングリコール酸ナトリウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	乳糖水和物、ポビドン、デンプングリコール酸ナトリウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、三二酸化鉄	乳糖水和物、ポビドン、デンプングリコール酸ナトリウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、黄色三二酸化鉄

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：サノフィ株式会社

(<http://www.sanofi.co.jp>)

くすり相談室

フリーダイヤル 0120-109-905