

向精神薬、習慣性医薬品、  
注意—習慣性あり  
処方箋医薬品  
注意—医師等の処方箋により  
使用すること

入眠剤  
日本薬局方  
ゾルピデム酒石酸塩錠  
**マイスリー<sup>®</sup>錠5mg**  
**マイスリー<sup>®</sup>錠10mg**  
Myslee<sup>®</sup> Tablets 5mg・10mg

日本標準商品分類番号

871129

	錠5mg	錠10mg
承認番号	21200AMZ00560	21200AMZ00561
薬価収載	2000年11月	
販売開始	2000年12月	
再審査結果	2016年3月	
国際誕生	1987年6月	

貯法：室温保存、ただし錠剤分割後は  
遮光保存

使用期限：ケース等に表示(製造後3年)

[使用期限内であっても開封後はなるべく速やかに使用すること。]

**【警告】**

本剤の服用後に、もうろう状態、睡眠随伴症状(夢遊症状等)があらわれることがある。また、入眠までの、あるいは中途覚醒時の出来事を記憶していないことがあるので注意すること。

**【禁忌(次の患者には投与しないこと)】**

- (1)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- (2)重篤な肝障害のある患者[代謝機能の低下により血中濃度が上昇し、作用が強くなりあらわれるおそれがある。] (「薬物動態」の項参照)
- (3)重症筋無力症の患者[筋弛緩作用により症状を悪化させるおそれがある。]
- (4)急性狭隅角緑内障の患者[眼圧が上昇し、症状を悪化させるおそれがある。]

**【原則禁忌(次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること)】**

肺性心、肺気腫、気管支喘息及び脳血管障害の急性期などで呼吸機能が高度に低下している場合[呼吸抑制により炭酸ガスナルコーシスを起こしやすい。]

**【組成・性状】**

## 1. 組成

	有効成分 (1錠中)	添加物
マイスリー錠5mg	日局 ゾルピデム酒石酸塩 5mg	乳糖水和物、結晶セルロース、 ヒプロメロース、デンプングリ コール酸ナトリウム、ステアリン 酸マグネシウム、酸化チタン、 マクロゴール、カルナウバロウ、 黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄
マイスリー錠10mg	日局 ゾルピデム酒石酸塩 10mg	

## 2. 製剤の性状

	剤形	色	外形・大きさ・重量			識別コード
			表	裏	側面	
マイスリー錠5mg	フィルムコーティング錠(片面割線入)	淡いだいだい色				601
			直径	厚さ	重量	
			約6.6mm	約2.7mm	約93mg	
マイスリー錠10mg	フィルムコーティング錠(片面割線入)	淡いだいだい色				631
			直径	厚さ	重量	
			約8.6mm	約3.3mm	約185mg	

**【効能・効果】**

不眠症(統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症は除く)

**〈効能・効果に関連する使用上の注意〉**

本剤の投与は、不眠症の原疾患を確定してから行うこと。なお、統合失調症あるいは躁うつ病に伴う不眠症には本剤の有効性は期待できない。

**【用法・用量】**

通常、成人にはゾルピデム酒石酸塩として1回5~10mgを就寝直前に経口投与する。なお、高齢者には1回5mgから投与を開始する。年齢、症状、疾患により適宜増減するが、1日10mgを超えないこととする。

**〈用法・用量に関連する使用上の注意〉**

- (1)本剤に対する反応には個人差があり、また、もうろう状態、睡眠随伴症状(夢遊症状等)は用量依存的にあらわれるので、本剤を投与する場合には少量(1回5mg)から投与を開始すること。やむを得ず増量する場合は観察を十分に行いながら慎重に投与すること。ただし、10mgを超えないこととし、症状の改善に伴って減量に努めること。
- (2)本剤を投与する場合、就寝の直前に服用させること。また、服用して就寝した後、患者が起床して活動を開始するまでに十分な睡眠時間がとれなかった場合、又は睡眠途中において一時的に起床して仕事等を行った場合などにおいて健忘があらわれたとの報告があるので、薬効が消失する前に活動を開始する可能性があるときは服用させないこと。

**【使用上の注意】**

## 1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1)衰弱患者[薬物の作用が強くなりあらわれ、副作用が発現しやすい。]
- (2)高齢者(「高齢者への投与」及び「薬物動態」の項参照)
- (3)心障害のある患者[血圧低下があらわれるおそれがあり、心障害のある患者では症状の悪化につながるおそれがある。]
- (4)肝障害のある患者(「禁忌」及び「薬物動態」の項参照)
- (5)腎障害のある患者[排泄が遅延し、作用が強くなりあらわれるおそれがある。] (「薬物動態」の項参照)
- (6)脳に器質的障害のある患者[作用が強くなりあらわれるおそれがある。]

## 2. 重要な基本的注意

- \*\* (1) 連用により薬物依存を生じることがあるので、漫然とした継続投与による長期使用を避けること。  
本剤の投与を継続する場合には、治療上の必要性を十分に検討すること。〔重大な副作用〕の項参照)
- (2) 本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

## 3. 相互作用

本剤は、主として肝薬物代謝酵素CYP3A4及び一部CYP2C9、CYP1A2で代謝される。

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
麻酔剤	呼吸抑制があらわれることがあるので、慎重に投与すること。	相加的に呼吸が抑制される可能性がある。
中枢神経抑制剤 フェノチアジン誘導体 バルビツール酸誘導体 等	相互に中枢神経抑制作用が増強することがあるので、慎重に投与すること。	本剤及びこれらの薬剤は中枢神経抑制作用を有する。
アルコール（飲酒）	精神機能・知覚・運動機能等の低下が増強することがあるので、できるだけ飲酒を控えさせること。	アルコールはGABA <sub>A</sub> 受容体に作用すること等により中枢神経抑制作用を示すため、併用により相互に中枢神経抑制作用を増強することがある。
リファンピシン	本剤の血中濃度が低下し、作用が減弱するおそれがある。	薬物代謝酵素CYP3A4が誘導され、本剤の代謝が促進される。

## 4. 副作用

承認時までの臨床試験では、1,102例（統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症を含む）中、副作用（臨床検査値の異常変動を除く）は190例（17.2%）に報告され、主な副作用は、ふらつき44例（4.0%）、眠気38例（3.4%）、頭痛31例（2.8%）、倦怠感31例（2.8%）、残眠感29例（2.6%）、悪心23例（2.1%）等であった。臨床検査値の異常変動は、ALT（GPT）上昇1.5%（12/778）、 $\gamma$ -GTP上昇1.1%（8/702）、AST（GOT）上昇1.0%（8/777）、LDH上昇1.0%（7/700）等であった。

市販後の調査等では、4,485例中、副作用（臨床検査値の異常変動を含む）は、230例（5.1%）に報告され、主な副作用は、眠気21例（0.5%）、ふらつき18例（0.4%）、肝機能障害18例（0.4%）、ALT（GPT）上昇17例（0.4%）、 $\gamma$ -GTP上昇16例（0.4%）、AST（GOT）上昇12例（0.3%）、一過性前向き健忘10例（0.2%）、LDH上昇9例（0.2%）等であった。

（再審査結果通知：2016年3月）

### (1) 重大な副作用

- \*\* (1) 依存性、離脱症状：連用により薬物依存（頻度不明）を生じることがあるので、観察を十分に行い、用量及び使用期間に注意し慎重に投与すること。また、連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、反跳性不眠、いらいら感等の離脱症状（0.1～5%未満）があらわれることがあるので、投与を中止する場合に

は、徐々に減量するなど慎重に行うこと。

- 2) 精神症状、意識障害：せん妄（0.1～5%未満<sup>注1)</sup>、錯乱（0.1～5%未満）、夢遊症状（0.1～5%未満<sup>注1)</sup>）、幻覚、興奮、脱抑制（各0.1%未満）、意識レベルの低下（0.1%未満<sup>注1)</sup>）等の精神症状及び意識障害があらわれることがあるので、患者の状態を十分観察し、異常が認められた場合には投与を中止すること。
- 3) 一過性前向き健忘、もうろう状態：一過性前向き健忘（服薬後入眠までの出来事を覚えていない、途中覚醒時の出来事を覚えていない）（0.1～5%未満）、もうろう状態（0.1～5%未満<sup>注1)</sup>）があらわれることがあるので、服薬後は直ぐ就寝させ、睡眠中に起こさないように注意すること。なお、十分に覚醒しないまま、車の運転、食事等を行い、その出来事を記憶していないとの報告がある。異常が認められた場合には投与を中止すること。
- 4) 呼吸抑制：呼吸抑制（頻度不明）があらわれることがある。また、呼吸機能が高度に低下している患者に投与した場合、炭酸ガスナルコーシスを起こすことがあるので、このような場合には気道を確保し、換気をはかるなど適切な処置を行うこと。
- 5) 肝機能障害、黄疸：AST（GOT）、ALT（GPT）、 $\gamma$ -GTP、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害（0.1～5%未満<sup>注1)</sup>）、黄疸（頻度不明）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

注1) 市販後の調査等における頻度

### (2) その他の副作用

	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
* 精神神経系	ふらつき、眠気、頭痛、残眠感、頭重感、めまい、不安、悪夢、気分高揚	錯視、しびれ感 <sup>注2)</sup>	振戦
血液	白血球増多、白血球減少		
肝臓	ALT（GPT）上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、AST（GOT）上昇、LDH上昇		
腎臓	蛋白尿		
* 消化器	悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛	下痢	口の錯感覚、食欲亢進
循環器	動悸		
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、そう痒感		
* 骨格筋	倦怠感、疲労、下肢脱力感		筋痙攣
眼	複視		視力障害、霧視
その他	口渇、不快感	転倒 <sup>注2)注3)</sup>	味覚異常

注1) 発現した場合には、投与を中止すること。

注2) 市販後の調査等における頻度

注3) 転倒により高齢者が骨折する例が報告されている。

### 5. 高齢者への投与

運動失調が起こりやすい。また、副作用が発現しやすいので、少量（1回5mg）から投与を開始し、1回10mgを超えないこと。〔薬物動態〕の項参照

## 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1)妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。妊娠後期に本剤を投与された患者より出生した児に呼吸抑制、痙攣、振戦、易刺激性、哺乳困難等の離脱症状があらわれることがある。なお、これらの症状は、新生児仮死として報告される場合もある。]
- (2)授乳婦：授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は、授乳を避けさせること。[母乳中へ移行することが報告されており、新生児に嗜眠を起こすおそれがある。〔薬物動態〕の項参照]

## 7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。(使用経験が少ない。)

## 8. 過量投与

**症状：**本剤単独の過量投与では、傾眠から昏睡までの意識障害が報告されているが、さらに中枢神経抑制症状、血圧低下、呼吸抑制、無呼吸等の重度な症状があらわれるおそれがある。

**処置：**呼吸、脈拍、血圧の監視を行うとともに、催吐、胃洗浄、吸着剤・下剤の投与、輸液、気道の確保等の適切な処置を行うこと。また、本剤の過量投与が明白又は疑われた場合の処置としてフルマゼニル（ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤）を投与する場合には、使用前にフルマゼニルの使用上の注意（禁忌、慎重投与、相互作用等）を必ず読むこと。なお、本剤は血液透析では除去されない。

## 9. 適用上の注意

**薬剤交付時：**PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]

## 10. その他の注意

投与した薬剤が特定されないままにフルマゼニル（ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤）を投与された患者で、新たに本剤を投与する場合、本剤の鎮静、抗痙攣作用が変化、遅延するおそれがある。


### 【薬物動態】

#### 1. 血漿中濃度

##### (1)健康成人

健康成人6例にゾルピデム酒石酸塩錠2.5～10mgを空腹時に単回経口投与したところ、ゾルピデムは速やかに吸収され、投与後0.7～0.9時間に最高血漿中濃度（C<sub>max</sub>）に達した後、消失半減期（t<sub>1/2</sub>）1.78～2.30時間で速やかに減少した。C<sub>max</sub>及び血漿中濃度-時間曲線下面積（AUC）は投与量に比例して増加した<sup>1)</sup>。また、健康成人6例にゾルピデム酒石酸塩錠10mgを1日1回7日間朝食後に経口投与したところ、血漿中濃度推移は1日目と7日目ではほぼ同じであった<sup>1)</sup>。

単回経口投与時の血漿中未変化体濃度（Mean±S.D.）



(工藤義雄 他：臨床医薬 6(4)：651, 1990、図6より改変)

単回経口投与時の薬物速度論的パラメータ

投与量 (mg)	T <sub>max</sub> (h)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	t <sub>1/2</sub> (h)	AUC <sub>0-∞</sub> (ng·h/mL)
2.5	0.7±0.3	32.6±9.6	1.78±0.48	96±58
5.0	0.8±0.3	76.2±29.7	2.06±1.18	259±218
7.5	0.9±0.6	102±42	1.86±0.47	330±163
10.0	0.8±0.3	120±73	2.30±1.48	491±474

(Mean±S.D.)

##### (2)高齢患者

高齢患者7例（67～80歳、平均75歳）にゾルピデム酒石酸塩錠5mgを就寝直前に経口投与したところ、高齢患者の方が健康成人に比べてC<sub>max</sub>で2.1倍、最高血漿中濃度到達時間（T<sub>max</sub>）で1.8倍、AUCで5.1倍、t<sub>1/2</sub>で2.2倍大きかった<sup>2)</sup>。

##### (3)肝機能障害患者（外国人データ）

肝硬変患者8例にゾルピデム酒石酸塩錠20mgを経口投与したところ、同年齢の健康成人に比べてC<sub>max</sub>は2.0倍、AUCは5.3倍大きかった<sup>3)</sup>。

肝硬変患者における薬物速度論的パラメータ

対象	T <sub>max</sub> (h)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	t <sub>1/2</sub> (h)	AUC <sub>0-∞</sub> (ng·h/mL)
肝硬変患者	0.69±0.54	499±215	9.91±7.57*	4203±3773
健康成人	0.72±0.42	250±57	2.15±0.25	788±279

(Mean±S.D.、※のみn=7)

(注)本剤の承認された1日用量は最大10mgである。

##### (4)腎機能障害患者（外国人データ）

慢性腎障害を有する患者16例（C<sub>cr</sub>：0～47mL/min）にゾルピデム酒石酸塩錠10mgを20分間静脈内持続注入したところ、健康成人に比べβ相での分布容量（V<sub>dβ</sub>）のみ有意に大きかった<sup>4)</sup>。

また、透析を受けている慢性腎障害患者9例にゾルピデム酒石酸塩錠10mgを1日1回13～18日間経口投与したときの血漿中濃度は単回投与時とほぼ同じであり、血中での蓄積は認められなかった<sup>5)</sup>。（下表）

透析患者における薬物速度論的パラメータ

	例数	T <sub>max</sub> (h)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	t <sub>1/2</sub> (h)	AUC <sub>0-∞</sub> (ng·h/mL)
単回投与	11*	1.7±1.0	172±96	2.4±1.3	796±527
反復投与	9	0.8±0.6	203±96	2.5±1.2	930±651

※反復投与9例と同一症例を含む

(Mean±S.D.)

(注)本剤の承認された用法は経口投与である。

## 2. 代謝

本剤の大部分は肝で代謝され、その主なものは芳香環のメチル基が酸化されてカルボン酸となった薬理活性を有しない代謝物であった<sup>6)</sup>。また、本剤は肝薬物代謝酵素CYP3A4のほかCYP2C9、CYP1A2など複数の分子種により代謝される<sup>7)8)</sup>。

## 3. 排泄

健康成人6例にゾルピデム酒石酸塩錠2.5～10mgを空腹時に単回経口投与したところ、投与後24時間までの尿中に排泄さ

れた未変化体は、いずれの投与量においても投与量の0.5%以下とごくわずかであった<sup>1)</sup>。また、健康成人6例にゾルピデム酒石酸塩錠10mgを1日1回7日間朝食後に経口投与したところ、投与初日、4及び7日目投与後24時間の尿中未変化体排泄率は単回投与時と同様、投与量の0.5%以下であった<sup>1)</sup>。

#### 4. 乳汁中への移行 (外国人データ)

授乳中の婦人5例にゾルピデム酒石酸塩錠20mgを経口投与したとき、未変化体の乳汁中排泄率は投与量の0.004~0.019%であった。投与後3時間目の乳汁中/血漿中濃度比は0.11~0.18であった<sup>9)</sup>。

(注)本剤の承認された1日用量は最大10mgである。

### 【臨床成績】

比較試験を含む臨床試験<sup>10)~21)</sup> (長期投与試験は除く)における、統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症以外の不眠症での改善率は59.6% (476例/799例)であった。

### 【薬効薬理】

#### 1. 動物の脳波に対する作用

ゾルピデム酒石酸塩は、サル、ネコ及びラットにおいて、より選択的に徐波睡眠を増加させた<sup>22)~24)</sup>。ネコ及びラットの覚醒-睡眠パターンに対する影響は少なかった<sup>25)26)</sup>。作用発現は速やかで、持続は短かった<sup>24)</sup>。

#### 2. その他の中枢作用

ゾルピデム酒石酸塩は、マウス及びラットにおいて、鎮静作用の他に、抗痙攣作用、抗不安作用、筋弛緩作用等を示すが、鎮静作用が最も少量であらわれた<sup>27)28)</sup>。

#### 3. 反復投与の影響

ゾルピデム酒石酸塩は、マウスにおいて、反復投与しても耐性の形成は弱かった<sup>29)</sup>。

#### 4. 作用機序

ゾルピデム酒石酸塩は、 $\omega_1$  (BZD)<sub>1</sub> 受容体に対して選択的な親和性を示し、GABA<sub>A</sub>系の抑制機構を増強するものと考えられる<sup>30)31)</sup>。

#### 5. 臨床薬理

##### (1)夜間睡眠に及ぼす影響

ゾルピデム酒石酸塩錠10mgを健康成人に就寝前に投与すると、睡眠潜時を短縮し<sup>32)</sup>、睡眠後はREM睡眠に影響することなく徐波睡眠を増加させ、翌朝への持ち越し効果、反跳現象はみられなかった<sup>32)~36)</sup>。

##### (2)記憶機能に対する作用


健康成人にゾルピデム酒石酸塩錠10mgを投与した1時間後には明らかな催眠作用がみられたが<sup>3)</sup>、翌朝の記憶検査では影響はみられなかった<sup>37)~40)</sup>。

### 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：ゾルピデム酒石酸塩 (Zolpidem Tartrate)

化学名：*N,N,N*,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-*a*]pyridine-3-acetamide hemi-(2*R*,3*R*)-tartrate

構造式：



分子式： $(C_{19}H_{21}N_3O)_2 \cdot C_4H_6O_6$

分子量：764.87

融点：約190°C (分解)

分配係数：(1-オクタノール/水系)

水	1.18	pH 5	4.61
pH 1	0.39	pH 7	309
pH 3	0.52	pH 9	377

旋光度： $[\alpha]_D^{20}$ ：約+1.8° (1g, *N,N*-ジメチルホルムアミド, 20mL, 100mm)

性状：ゾルピデム酒石酸塩は白色の結晶性の粉末である。酢酸(100)に溶けやすく、*N,N*-ジメチルホルムアミド又はメタノールにやや溶けやすく、水にやや溶けにくく、エタノール(99.5)又は無水酢酸に溶けにくい。0.1mol/L塩酸試液に溶ける。光によって徐々に黄色となる。

### 【包装】

錠5mg：100錠(10錠×10)、700錠(14錠×50)、1,000錠(10錠×100)、1,000錠(バラ)  
錠10mg：100錠(10錠×10)、700錠(14錠×50)、1,000錠(10錠×100)、1,000錠(バラ)

### 【主要文献及び文献請求先】

#### 1. 主要文献

- 1) 工藤義雄 他：臨床医薬 6 (4)：651, 1990 [MYS-00097]
- 2) 本間 昭 他：社内報告書 (高齢不眠症患者・薬物動態) (DIR000024)
- 3) Bercoff, E. et al.：社内報告書 (海外肝硬変患者・薬物動態) (DIR000015)
- 4) Bouchet, J.L. et al.：社内報告書 (海外慢性腎障害患者・薬物動態) (DIR000016)
- 5) Fillastre, J.P. et al.：社内報告書 (海外慢性腎障害患者・薬物動態) (DIR000018)
- 6) Warrington, S. et al.：社内報告書 (海外健康成人・薬物動態) (DIR000014)
- 7) Pichard, L. et al.：Drug Metab. Dispos. 23 (11)：1253, 1995 [MYS-00199]
- 8) Moltke, L.L. et al.：Br. J. Clin. Pharmacol. 48 (1)：89, 1999 [MYS-00346]
- 9) Pons, G. et al.：Eur. J. Clin. Pharmacol. 37 (3)：245, 1989 [MYS-00032]
- 10) 工藤義雄 他：臨床医薬 9 (Suppl.2)：3, 1993 [MYS-00103]
- 11) 風祭 元 他：臨床医薬 9 (Suppl.2)：23, 1993 [MYS-00104]
- 12) 工藤義雄 他：臨床医薬 9 (Suppl.2)：57, 1993 [MYS-00106]
- 13) 筒井末春 他：臨床医薬 9 (Suppl.2)：101, 1993 [MYS-00108]
- 14) 工藤義雄 他：臨床医薬 9 (1)：79, 1993 [MYS-00099]
- 15) 筒井末春 他：臨床医薬 9 (2)：387, 1993 [MYS-00102]
- 16) 筒井末春 他：臨床医薬 16 (5)：649, 2000 [MYS-00466]
- 17) 北守 茂 他：臨床医薬 9 (Suppl.2)：121, 1993 [MYS-00109]
- 18) 古田寿一 他：臨床医薬 9 (Suppl.2)：149, 1993 [MYS-00111]
- 19) 八木剛平 他：臨床医薬 9 (Suppl.2)：167, 1993 [MYS-00112]
- 20) 松岡幸彦 他：社内報告書 (不眠症患者・臨床試験) (DIR000025)
- 21) 片山宗一 他：臨床医薬 9 (Suppl.2)：137, 1993 [MYS-00110]
- 22) 佐藤 壽 他：プレインサイエンス 5 (3)：309, 1994 [MYS-00444]
- 23) Depoortere, H.：社内報告書 (ネコ・薬理作用) (DIR000001)
- 24) Depoortere, H.：社内報告書 (ラット・薬理作用) (DIR000002)
- 25) Depoortere, H.：社内報告書 (ネコ・薬理作用) (DIR000003)
- 26) Depoortere, H.：社内報告書 (ラット・薬理作用) (DIR000004)

- 27) 佐藤 壽 他：社内報告書（マウス・薬理作用）  
（DIR000020）
- 28) Perrault, G. et al.：社内報告書（ラット・薬理作用）  
（DIR000007）
- 29) Perrault, G. et al.：社内報告書（マウス・薬理作用）  
（DIR000008）
- 30) Schoemaker, H. et al.：社内報告書（ラット大脳皮質・  
薬理作用）（DIR000009）
- 31) 佐藤 壽 他：社内報告書（ラット小脳他・薬理作用）  
（DIR000019）
- 32) 延原健二 他：神経精神薬理 14 (2)：137, 1992  
[MYS-00098]
- 33) 菅野 道 他：神経精神薬理 15 (9)：589, 1993  
[MYS-00123]
- 34) 中込和幸 他：神経精神薬理 15 (9)：603, 1993  
[MYS-00116]
- 35) Nakajima, T. et al.：Psychiatry Clin. Neurosci. 54 (1)：37,  
2000 [MYS-00457]
- 36) Nakajima, T. et al.：Life Sci. 67 (1)：81, 2000  
[MYS-00491]
- 37) 鈴木牧彦 他：神経精神薬理 15 (6)：375, 1993  
[MYS-00136]
- 38) 内海光朝 他：神経精神薬理 16 (1)：45, 1994  
[MYS-00154]
- 39) Isawa, S. et al.：日本神経精神薬理学雑誌 20 (2)：61,  
2000 [MYS-00492]
- 40) Uchiumi, M. et al.：日本神経精神薬理学雑誌 20 (3)：  
123, 2000 [MYS-00518]

## 2. 文献請求先・製品情報お問い合わせ先

主要文献に記載の社内報告書につきましても下記にご請求  
下さい。

アステラス製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター  
〒103-8411 東京都中央区日本橋本町2丁目5番1号  
☎ 0120-189-371

---

本剤は厚生労働省告示第97号（平成20年3月19日付、平成18  
年厚生労働省告示第107号 一部改正）に基づき、1回30日分  
を超える投薬は認められていない。

製造販売

**アステラス製薬株式会社**

東京都中央区日本橋本町2丁目5番1号

販売提携

**サノフィ株式会社**

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

提携

**SANOFI** 