

4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)

メナクトラ[®]筋注

接種後の注意点



接種される方へお渡しください

メナクトラ[®] 筋注を接種される方へ



接種後**30分**は特に注意しましょう。

- 接種直後または接種後に、血管迷走神経反射*による**失神**があらわれることがあります。**失神の際の転倒**を避けるために、次のことを守りましょう。
 - ・接種後に診察室から待合室などへ移動するときには、看護師さんや保護者の方に支えてもらいながら、移動しましょう。
 - ・接種後30分程度は、背もたれや肘かけのあるイスなど、体重を預けられるような場所で安静にして様子を見ましょう。
 - ・安静にしている間はなるべく立ち上がることを避け、座っていきましょう。



*血管迷走神経反射：注射を打ったときの痛み、恐怖、興奮などによる刺激が脳神経のひとつである迷走神経を介して中枢に伝わり、心拍数が減ったり、血圧がさがったりすることです。
そのため、気分が悪くなったり、めまいやふらつき、失神による転倒などがおこったりします。

- 接種後に、**アナフィラキシー**(皮膚のかゆみ、じんましん、息苦しさ、動悸、意識の低下など)がおこることがあります。**アナフィラキシーは通常接種後30分以内におこることが多い**ので、この間接種した医療機関内で待機するか、すぐに医師と連絡をとれるようにしておきましょう。

- 接種後は、健康状態によく気をつけましょう。接種部位の異常な反応や体調の変化、高熱、けいれんなどの異常を感じた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- 接種当日は激しい運動を避け、接種部位を清潔に保ちましょう。
- 他の医師を受診したり、他のワクチンを接種したりする場合は、必ずこのワクチンを接種したことを医師、薬剤師または看護師に伝えてください。

出現する可能性のある主な副反応

メナクトラ[®]筋注の接種後には、他のワクチン接種と同様の副反応がみられますが、通常は一時的なもので数日で消失します。最も多くみられるのは接種部位の痛み、筋肉痛、倦怠感、頭痛などです。また、海外では重い副反応として、血管迷走神経反射による**失神**、**ショック**、**アナフィラキシー**、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、**ギラン・バレー症候群**、**横断性脊髄炎**、**けいれん**、**顔面神経麻痺**などが報告されています。



ワクチン接種医療機関(医療機関名・住所・電話番号)

SANOFI PASTEUR 

サノフィ株式会社