

# アラバ<sup>®</sup>錠100mgを服用される方へ

このお薬の服用にあたっては、医師・薬剤師の指示に従い、薬のみ方を守ってください。

**このお薬は関節リウマチのお薬です。**

体の免疫反応を調節することによって、関節リウマチの関節の痛み、炎症を抑えます。

**1日1回1錠ずつ服用してください。**

- 妊娠している方、妊娠の疑いのある方、授乳中の方はこのお薬を服用しないでください。
- 急性・慢性活動性のウイルス性肝炎、肝硬変などの慢性肝疾患のある方はこのお薬を服用しないでください。
- 活動性結核（治療が必要な結核）の方はこのお薬を服用しないでください。
- 間質性肺炎や結核と診断されたことのある方、過去に呼吸困難等があった方は、必ず服用前に医師にご相談ください。
- のみ忘れたとしても、次の日に2回分を一度に服用しないでください。
- このお薬は、初めての服用日から3日間だけ服用する薬です。4日目以降は、絶対服用しないでください。
- 作用が強いお薬ですので、誤って他の人が服用することがないように、厳重に保管してください。
- のみ残したお薬はすべて廃棄してください。

—— **大切な注意です。必ずお読みください。** ——

- 1.妊娠中、あるいは妊娠の疑いのある女性、授乳中の女性は服用を避けてください。また、治療中の男性は配偶者が妊娠することを避けてください。服用中および服用終了後に妊娠を希望される方は医師にご相談ください。
- 2.このお薬により、下痢、脱毛、肝障害などが起こることがあります。
- 3.このお薬をのみ始めてから身体の異常に気づいたことがあれば、医師・薬剤師に相談してください。  
特に以下のような症状に気づいたときは服用を中止して、次の診察日を待たずにすぐ医師に相談してください。  
**せき（からせき、持続するせき）、持続する痰、発熱、呼吸困難、発疹、皮膚のかゆみ、口内炎、だるさ、黄疸**
- 4.このお薬により、身体の抵抗力が弱まり、かぜなどの感染症にかかりやすくなる場合があります。  
人ごみを避けたり、帰宅後は手洗いやうがいなどをして、感染症にかからないように気をつけてください。

ご連絡先