

# ポリオについて

発症後の  
治療がなく、  
注意が必要です

## ポリオの症状と後遺症

ポリオはポリオウイルスによる急性のウイルス感染症です。

- ポリオは重症な場合、手足に“まひ”などを引き起こします。呼吸不全や肺炎で死亡することもあります。
- いったん起こった“まひ”は回復しない場合も多く、後遺症につながります。
- 発症した場合、有効な治療法がありません。



## ポリオワクチンの接種スケジュール

生後3ヵ月になったら不活化ポリオワクチン(IPV)が含まれている四種混合ワクチン(DPT-IPV)を接種します。

**1回目～3回目(定期接種)**:それぞれ3週間以上間隔をあけます。

**4回目(定期接種)**:3回目から6ヵ月以上あけて接種します。

**5回目(任意接種)**:海外でもIPVを導入している多くの国で4歳以降の接種がされています。より長い間病気から守るために、4～6歳の間に、不活化ポリオワクチンの接種を受けましょう。



VPD\*からお子さんを守るためには、定期接種、任意接種を問わず、予防接種を受けておくことが重要です。

先生、看護師さんと相談して、すべてのワクチンの必要性を理解し、お子さんのワクチンスケジュールを決めましょう。

\*VPD(Vaccine Preventable Disease): ワクチンで予防することができる病気

サノフィパスツールは、世界で10億回接種分を超えるワクチンを製造し、5億人以上もの人に接種されています。

## もっと知りたいポリオワクチン

▶▶▶ <http://vaccine-net.jp/index.html>





# お子さんをVPD\*から守るために

\*VPD(Vaccine Preventable Disease): ワクチンで予防することができる病気

定期接種は、予防接種法で接種が定められているワクチン、  
任意接種はそれ以外のワクチンをさします<sup>1)</sup>。  
どちらのワクチンも、同じく必要です。

1) NPO法人 VPDを知って子どもを守ろうの会ウェブサイト「予防接種のスケジュール」  
[http://www.know-vpd.jp/children/children\\_basic.htm](http://www.know-vpd.jp/children/children_basic.htm)(アクセス日:2017年7月)



## 各国の定期予防接種

日本では任意接種のワクチンも、世界では定期接種とされているワクチンがいくつもあります<sup>2)</sup>。

2) 厚生労働省. 予防接種情報 [http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/index.html](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/index.html)  
(アクセス日:2017年7月)

|               | 日本 | アメリカ                | ドイツ                 | イギリス                                   | フランス                  | イタリア             | カナダ                         |
|---------------|----|---------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| おたふくかぜ        |    | 12カ月と<br>4歳         | 11~14カ月と<br>15~23カ月 | 12カ月と<br>3歳4カ月                         | 12カ月と<br>16~18カ月      | 13~15カ月と<br>5~6歳 | 12カ月と<br>18カ月または<br>4~6歳    |
| ロタ            |    | 2カ月と<br>4カ月と<br>6カ月 | 6週と<br>10週と<br>14週  | 8週と<br>12週                             |                       |                  | 2カ月と<br>4カ月と<br>6カ月         |
| ポリオ<br>(4歳以上) |    | 4歳以上                | 9~17歳               | 14歳                                    | 6歳と<br>11~13歳と<br>25歳 | 5~6歳             | 4~6歳                        |
| 髄膜炎菌          |    | 11歳以上と<br>16歳以上     | 11~23カ月             | 2カ月と4カ月と<br>12カ月と<br>14歳<br>(2016年定期化) | 12カ月                  | 13~15カ月          | 小児期<br>(1~4回)と<br>10代前半(1回) |
| 百日咳<br>(4歳以上) |    | 4~6歳と<br>11~12歳     | 5~6歳と<br>9~17歳      |  | 6歳と<br>11~13歳と<br>25歳 | 5~6歳と<br>11~18歳  | 4~6歳と<br>14~16歳と<br>18歳以上   |